

ワクチン		生直後	6週	2ヵ月	3ヵ月	4ヵ月	5ヵ月	6ヵ月	7ヵ月	8ヵ月	9ヵ月～11ヵ月
B型肝炎 定期 不活化	ユニバーサル										
	母子感染予防			※母親がHBs抗原陽性の場合は接種							
ロタウイルス 定期 生	1価							※生後24週まで			
	5価									※生後32週まで	
小児用肺炎球菌 定期 不活化											
5種混合 (DPT-IPV-Hib) 定期 不活化											
3種混合 (DPT) 定期 不活化											
2種混合 (DT) 定期 不活化											
ポリオ (IPV) 定期 不活化											
インフルエンザ菌b型 (ヒブ) ※アクトヒブ®で初回接種する場合 定期接種可能 不活化											
4種混合 (DPT-IPV) ※4種混合ワクチンで初回接種する場合 定期接種可能 不活化											
BCG 定期 生											
日本脳炎 定期 不活化						※生後6ヵ月から接種可能		※3歳に定期接種			
インフルエンザ 任意						※生後6ヵ月から接種可能		※毎年10、11月など			
新型コロナウイルス 任意						※生後6ヵ月から接種可能		※毎年10、11月など			

CHECK

 5種混合 (4回)
 又は
 4種混合とHib
 (それぞれ4回)

年齢によって使用できる製剤が異なるため、医師に相談のうえ接種

定期接種の推奨期間
定期接種の接種可能な期間
任意接種の接種可能な期間
健康保険での接種可能な期間